

Клинический протокол скорой медицинской помощи при ухудшении течения гипертонической болезни

Нозологическая форма	Гипертоническая болезнь
Код по МКБ-10	I 10 Эссенциальная (первичная) гипертензия I 15 Вторичная гипертензия
Фаза	Острое состояние
Стадия	Любая
Вид медицинской помощи	Скорая медицинская помощь
Условия оказания медицинской помощи	Вне медицинской организации
Форма оказания медицинской помощи	Экстренная

Критерии отнесения пациента к модели	Индивидуально повышенное АД без клинических проявлений гипертензивного криза.
Классификация	1. Эссенциальная артериальная гипертензия. 2. Вторичная артериальная гипертензия.
Осложнения	Без осложнений
Формулировка развернутого диагноза	<ul style="list-style-type: none"> • Гипертоническая болезнь II стадии, артериальная гипертензия III степени, риск 4. Ухудшение течения.

1. Медицинские мероприятия для диагностики заболевания, состояния.

Наименование медицинской услуги
Осмотр врачом скорой медицинской помощи и определение параметров витальных функций (уровень сознания, АД, ЧСС, ЧД, T °C).
Осмотр врачом скорой медицинской помощи и определение параметров витальных функций (уровень сознания, АД, ЧСС, ЧД, T °C).

2. Инструментальные методы исследования.

Наименование медицинской услуги	Примечания
Регистрация электрокардиограммы. Передача дистанционной ЭКГ.	Для всех бригад при боли в грудной клетке, нарушении ритма сердца, одышке. Для общепрофильных бригад при наличии технической возможности и трудной дифф.диагностике
Описание и интерпретация электрокардиографических данных.	Для всех бригад.
Пульсоксиметрия.	Для всех бригад, при явлениях ХСН.

3. Медицинские услуги для лечения заболевания, состояния и контроля за лечением.

Наименование медицинской услуги	Примечания
Сублингвальное назначение лекарственных препаратов	Для всех бригад
Контроль АД	Для всех бригад
Медицинская эвакуация	См. тактический алгоритм*

4. Перечень лекарственных препаратов для медицинского применения, зарегистрированных на территории Российской Федерации, с указанием средних разовых доз.

Анатомо-терапевтическо-химическая классификация	Наименование лекарственного препарата	Доза	Примечания
Агонисты имидазолиновых рецепторов	При любом типе гемодинамики.		
	Моксонидин	0,6 мг	По 0,2-0,4 мг сублингвально до достижения эффекта
Неселективные бета-адреноблокаторы	При гипер/эукинетическом типе гемодинамики.		
	Пропранолол	40 мг	По 10 мг сублингвально до достижения эффекта.
Производные дигидропиридина	При гипо/эукинетическом типе гемодинамики.		
	Нифедипин (препарат выбора при беременности)	10-40 мг	По 10-20 мг сублингвально с возможным повтором ч/з 10 мин. Противопоказан при подозрении на ОКС.
Ингибиторы АПФ	При гипо/эукинетическом типе гемодинамики.		
	Каптоприл	25-50 мг	По 25 мг сублингвально с возможным повтором ч/з 10-15 мин

5. Критерии эффективности.

- Снижение цифр АД на 10-15 мм.рт.ст. для систолического в течение первых 20 минут.

6. Тактический алгоритм.

- Назначается активное посещение участковым врачом. Медицинская эвакуация в стационар предлагается при повторном вызове в течение суток